

F _ _ _ _ _ B _ _ _ _ _



Theodoxus prevostianus

Legfontosabb jellemzők


A tekerecs elenyésző méretű, a házat az utolsó kanyarulat uralja, így az felülnézetben tojásdad alakú, fala vastag, átlátszatlan, felszíne rajzoltos. A szájadék félkör-alakú, pereme egyszerű, vele szemben látható a lapos, fehér boltozat, köldök nincs.

Melegvízi faj, amely a Kárpát-medence területén endemikus. Ma egyedül a Bükk alján Kácsfűrdőn lelhető fel. Köves patakmederben érzik jól magukat, az iszapban nem telepednek meg.




A ház hossza 4-6 mm.

A szárazföldi csigáktól eltérően váltivarúak, szaporodási időszakuk április közepétől októberig tart. 45-65 petéjét kövekre, kagylókra vagy gyakran más bődönccsigák héjára tapasztja.



A petékből a csigák kb. egy hónap múlva kelnek ki. Élettartamuk 2-3 év.

A köveken, fatörzseken megtelepedett algákat fogyasztja, ezért köves aljzatú folyórészekben, esetleg tavakban, barlangi patakokban található.



A héja erős, belső oldalát vastag gyöngyházréteg borítja. A szájadékot az állat egy házfedővel le tudja zárni.

Egy olyan puhatestű család (Neritidae) tagja, melynek legtöbb faja tengeri. A pannon biogeográfiai régió bennszülött maradvány faja, melyet speciális élőhelyi igényei miatt hazánkban leginkább fenyeget a kihalás veszélye. Magyarország területén kívül három ismert populáció van: Ausztriában a Bécs melletti hévizekben kettő (Bad Vöslau és Bad Fichau) és Szlovéniában egy populáció. A faj globális védelme szempontjából Magyarország szerepe és felelőssége elsődleges.

Források:

Dr. Kriska György: Édesvízi gerinctelenek

http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_759

<http://greenfo.hu/hirek/2017/05/02/visszatertek-a-fekete-bodonccsigak-vizfore>

http://mttmuzeum.blog.hu/2015/09/21/a_kacsi_fantom

<https://24.hu/tudomany/2017/05/06/talan-megmentheto-egy-allat-ami-csak-a-karpat-medenceben-el/>

